



TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA (TC)

QUESTIONÁRIO E CONSENTIMENTO INFORMADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE CONTRASTE

Imp_crm _____ Edição ____ Data ____/____/____

OBS N.º _____

Data ____/____/____

Peso _____ kg

Preencha este questionário com o maior rigor possível. Em caso de dúvida, fale com o técnico ou o médico radiologista responsáveis pelo exame.

QUESTIONÁRIO

RESPONDA COM UMA CRUZ (X)	NÃO	SIM
Já fez algum exame com contraste iodado (TC, angiografia, urografia)?		
Já teve alguma reação ao contraste iodado?		
Tem asma sob tratamento médico?		
Tem alergias graves que já precisaram de tratamento (ex.: reação alérgica grave)?		
Tem doença renal ou insuficiência renal?		
Faz diálise?		
Tem diabetes?		
Toma metformina ou antidiabéticos que a contenham (ex.: Glucophage, Stagid, Risidon, Janumet)?		
Tem doença da tiroide, em especial hipertiroidismo/bócio (tiroide "acelerada")?		
Se é do sexo feminino: está grávida ou com possibilidade de gravidez?		
Está a amamentar?		

Reação ao contraste iodado (se SIM) – gravidade: ligeira ☐ moderada ☐ grave ☐

Alergias (se SIM) – a quê (medicamentos, alimentos, outras): _____

Medicação habitual:

Se toma metformina ou tem doença renal, informe-nos: poderá ser necessário avaliar a função renal (análise) e, em certos casos, suspender a metformina durante 48 horas após o contraste. A equipa indicá-lo-á.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO DE CONTRASTE

Em muitos exames de TC é necessária a administração de um produto de contraste iodado por via endovenosa, com a sua autorização, para ajudar a detetar e caracterizar lesões. A necessidade e o tipo de contraste são avaliados individualmente, com base na indicação clínica e na zona a estudar.

A maioria das pessoas tolera bem o contraste. Podem ocorrer:

- reações ligeiras (calor, náuseas, sabor metálico, urticária ligeira) – frequentes e passageiras;
- reações moderadas (urticária marcada, edema da face, broncospasmo ligeiro, alterações da tensão) – pouco frequentes;
- reações graves (reação alérgica grave/anafilaxia, muito raramente com risco de vida) – raras.

A equipa está preparada para tratar estas situações e vigia-o(a) após a injeção. Raramente o contraste pode sair da veia no local da picada (extravasamento), causando inchaço e dor que habitualmente resolvem – avise a equipa se sentir dor.

Gravidez: o contraste iodado só é utilizado se for realmente necessário para o diagnóstico. Amamentação: pode continuar normalmente após a administração do contraste.

**CONSENTIMENTO****ASSINALE UMA DAS OPÇÕES COM UMA CRUZ (X):**

- ☐ AUTORIZO, em caso de necessidade, a administração intravenosa de produto de contraste.
- ☐ NÃO AUTORIZO a administração intravenosa de produto de contraste.

Declaro que li e compreendi a informação acima descrita e devidamente explicada, que esclareci as minhas dúvidas e que posso revogar este consentimento a qualquer momento, mesmo depois de assinar.

Assinatura ou nome do(a) utente ou do(a) responsável legal	Data
	____/____/____
Na impossibilidade de ser o(a) utente a assinar – N.º de identificação	Grau de parentesco
Validado por (médico ou técnico radiologista)	Data
	____/____/____

Proteção de dados: os dados recolhidos destinam-se exclusivamente à realização do exame, ao seu relatório e ao arquivo clínico, sendo tratados ao abrigo do RGPD (Regulamento (UE) 2016/679) e da Lei n.º 58/2019. Pode exercer os seus direitos de acesso, retificação e demais previstos na lei junto da CRMA (encarregado de proteção de dados).